

Preparación para colonoscopia con CLENPIQ

Procedimiento antes del mediodía

- **Compre lo siguiente en la farmacia:**

- Una (1) caja de cápsulas blandas orales de simeticona extra fuerte (Gas-X) de 125 mg (de venta libre)
- Solución CLENPIQ (*medicamento recetado, retire en la farmacia*)

Instrucciones para la preparación intestinal

El **día anterior** a la colonoscopia, la dieta debe consistir ÚNICAMENTE en LÍQUIDOS CLAROS (no se permiten alimentos sólidos).

- No consuma líquidos de color rojo o morado. No consuma productos lácteos ni jugos con pulpa. Los líquidos claros incluyen agua, café negro, té, jugo de manzana, jugo de uva blanca o arándano, limonada, bebidas deportivas (Gatorade, PowerAde, etc.), caldo claro de res, pollo o verduras, gelatina, paletas heladas, sorbete congelado o hielo italiano. No se permiten bebidas alcohólicas.
- Puede refrigerar la solución para preparación intestinal CLENPIQ.
- **El día anterior al procedimiento a las 4:00 p. m., haga lo siguiente:**
 - Beba la primera botella de ocho (8) onzas de solución CLENPIQ seguida de cinco (5) vasos de ocho (8) onzas de líquido claro. Esto debe consumirse en un plazo de 5 horas y antes de la siguiente dosis de CLENPIQ.
- **El día anterior al procedimiento a las 10:00 p. m., haga lo siguiente:**
 - Beba la segunda botella de ocho (8) onzas de solución CLENPIQ seguida de tres (3) vasos de ocho (8) onzas de líquido claro.
 - Tome dos (2) cápsulas blandas orales de simeticona extra fuerte (Gas-X) (250 mg en total).

⇒ **Luego de la medianoche, no consuma nada por vía oral, salvo un sorbo de agua para tomar los medicamentos necesarios.**

Si surge algún problema durante el proceso de preparación intestinal, comuníquese con la guardia de gastroenterología al **(941) 262-0400**.

Guía de preparación

	Oscuro y turbio
	Marrón y turbio
	Naranja oscuro y semitransparente
	Naranja claro y mayormente transparente
	Amarillo y transparente